



krebsliga



# Das begehbare Darmmodell

## Weitere Informationen

### Broschüren

- Booklet «Darmkrebs – Die wichtigsten Fragen und Antworten»
- Broschüre «Früherkennung von Darmkrebs»
- Patientenbroschüre «Dickdarm- und Enddarmkrebs»

### Bestellmöglichkeiten

- Telefon 0844 85 00 00
- [shop@krebsliga.ch](mailto:shop@krebsliga.ch)
- [www.krebsliga.ch/broschueren](http://www.krebsliga.ch/broschueren)
- Bei der Krebsliga Ihres Kantons (Adressen der kantonalen Krebsligen unter [www.krebsliga.ch](http://www.krebsliga.ch))

### Internet

[www.krebsliga.ch/darmkrebs](http://www.krebsliga.ch/darmkrebs)

#### Impressum

**Herausgeberin**  
Krebsliga Schweiz  
Effingerstrasse 40  
3001 Bern  
Tel. 031 389 91 00  
Fax 031 389 91 60  
[info@krebsliga.ch](mailto:info@krebsliga.ch)  
[www.krebsliga.ch](http://www.krebsliga.ch)

**Autorin / Koordination**  
Cornelia Schwager,  
Krebsliga Schweiz, Bern

**Fachliche und redaktionelle Mitarbeit**  
Dr. med. Karin Huwiler,  
Krebsliga Schweiz, Bern

**Grafik und Gestaltung**  
Partner & Partner, Winterthur

**Fotos**  
Stefan Kubli, Zürich

**Druck**  
Geiger AG, Bern

Dieses Faltblatt ist auch in französischer und italienischer Sprache erhältlich.

© 2015 Krebsliga Schweiz, Bern

KLS/4.2015/6000 D/1659

Überreicht durch:



Ein Angebot der Krebsliga

# Das begehbare Darmmodell

Wussten Sie, dass Darmkrebs zu den häufigsten Krebserkrankungen gehört? Jährlich werden in der Schweiz rund 4100 Menschen mit der Diagnose Darmkrebs konfrontiert und rund 1700 Menschen sterben an den Folgen der Krankheit. Wird Darmkrebs früh erkannt, ist er in den meisten Fällen heilbar. Die zwei wichtigsten Früherkennungsmethoden sind der «Blut-im-Stuhl-Test» und die Darmspiegelung.

Im begehbaren Darmmodell wird die Entwicklung vom Polypen zum bösartigen Tumor im Dickdarm dargestellt.



## Darmkrebs mit Durchbruch

Wird ein Polyp nicht entdeckt und entfernt, kann sich aus ihm ein bösartiger Tumor entwickeln. Der Krebs kann durch die Schleimhaut und die Muskelschicht des Darms wachsen und die Darmwand nach aussen durchbrechen. An anderen Stellen des Körpers kann er auch Ableger bilden.



## Polypenstumpf

Polypen können bei einer Darmspiegelung entdeckt und auch gleich entfernt werden. Nach der Entfernung eines Polypen bleibt ein Stumpf zurück. An dieser oder auch an anderen Stellen im Darm können sich später neue Polypen bilden.



Langstieliger Polyp

Kurzstieliger Polyp

## Polyp

In den meisten Fällen entsteht Darmkrebs aus einer gutartigen Wucherung der Schleimhaut, einem sogenannten Polypen. Normalerweise dauert die Entwicklung vom gutartigen Polypen bis zum bösartigen Tumor bis zu zehn Jahre. Polypen können verschiedene Formen und Grössen annehmen. Je grösser ein Polyp, desto grösser ist das Risiko, dass daraus Darmkrebs entsteht.



Flacher Polyp

Breitbasiger Polyp



## Divertikel

Divertikel sind bläschenartige Ausstülpungen der Darmschleimhaut. Sie kommen häufig vor, sind aber keine Vorstufe von Darmkrebs.