



lega contro il cancro



Il modello d'intestino percorribile

Ulteriori informazioni

Opuscoli

- > Opuscolo «Cancro dell'intestino – Principali domande e risposte»
- > Opuscolo per i pazienti «Il cancro del colon e del retto»

Gli opuscoli si possono ordinare

- > per telefono 0844 85 00 00
- > per e-mail: shop@legacancro.ch
- > su Internet all'indirizzo: www.legacancro.ch/opuscoli
- > presso le Lega contro il cancro del Vostro cantone (indirizzi delle leghe cantonali sul sito www.legacancro.ch)

Internet

www.legacancro.ch/cancrointestino

Impressum

._Editrice

Lega svizzera contro il cancro (LSC)
Effingerstrasse 40
Casella postale 8219
3001 Berna
Tel. 031 389 91 00
Fax 031 389 91 60
info@legacancro.ch
www.legacancro.ch

._Autrice / coordinazione

Cornelia Schwager,
Lega svizzera contro il cancro, Berna

._Collaborazione specialistica e redazionale

Dr. med. Karin Huwiler,
Lega svizzera contro il cancro, Berna

._Design

Partner & Partner, Winterthur

._Fotografie

Stefan Kubli

._Stampa

Geiger AG, Berna

Questa scheda informativa è disponibile anche in tedesco e in francese.

© 2014 Lega svizzera contro il cancro, Berna

Offerto da:



Un'offerta della Lega contro il cancro

Il modello d'intestino percorribile

Sapevate che il cancro dell'intestino è uno dei tumori maligni più frequenti? In Svizzera viene diagnosticato ogni anno a circa 4100 persone, mentre nello stesso arco di tempo muoiono approssimativamente 1600 pazienti delle conseguenze di questa malattia. Se il cancro dell'intestino viene diagnosticato precocemente, nella maggior parte dei casi se ne può guarire. I due metodi più importanti per la diagnosi precoce sono il test del sangue occulto nelle feci e l'endoscopia dell'intestino (colonscopia).

Nel modello d'intestino percorribile viene illustrato lo sviluppo di tumori maligni nell'intestino crasso a partire dai polipi.



Cancro dell'intestino con perforazione

Da un polipo non rilevato e non rimosso può svilupparsi un tumore maligno. Il cancro può accrescersi nello spessore della mucosa e dello strato muscolare della parete intestinale, provocandone la perforazione verso l'esterno. Il cancro può anche dare origine a metastasi (tumori a distanza) in altri distretti dell'organismo.



Moncone di polipo

I polipi possono essere individuati e anche asportati immediatamente nel corso dell'endoscopia dell'intestino. Dopo rimozione di un polipo residua un moncone. In questo punto, o anche in altri tratti dell'intestino, possono formarsi successivamente nuovi polipi.



Polipo lungo

Polipo corto

Polipi

Nella maggior parte dei casi il cancro dell'intestino ha origine da una proliferazione benigna della mucosa, il cosiddetto «polipo». In genere, l'evoluzione da polipo benigno a tumore maligno dura fino a dieci anni. I polipi possono assumere diverse forme e dimensioni. Maggiori sono le dimensioni del polipo, più elevato sarà il rischio che da esso origini un cancro intestinale.



Polipo piatto

Polipo ampio



Diverticoli

I diverticoli sono estroflessioni della mucosa intestinale che assomigliano a vescicole. Si rinvencono di frequente, ma non sono uno stadio precoce del cancro intestinale.

